

# BODY FLUID CLEAN-UP PROCEDURES

体液（嘔吐物や下痢など）にはノロウイルスが含まれており、最大で25フィート（約7.6メートル）まで広がり、表面や食べ物を汚染する可能性があります。これにより、消費者と従業員の両方にリスクをもたらします。嘔吐物や下痢の適切な清掃には、ノロウイルスへの曝露を効果的に減少させるために、通常の清掃よりも厳格なアプローチが必要です。

対応策と、効果的に清掃・消毒するための適切なアイテムが重要であり、これにより従業員と顧客を保護することができます。

## 最初のステップ:

1. 25フィート（約7.6メートル）以内の全員を避難させる。
2. 汚染された区域へのアクセスを遮断する。
3. 個人用保護具を着用する。嘔吐物や下痢を清掃する際には、最低限使い捨て手袋とマスクを着用する。
4. 半径内の覆われていない食品や使い捨てアイテムを廃棄する。
5. そのエリアのすべての器具や設備を洗浄し、すすぎ、消毒する。

## 清掃手順:

1. 保護服と紙タオルを使用して、嘔吐物や下痢をすぐに取り除き、清潔な部分から汚染された部分へと作業を進める。
2. カーペット上の液体は、猫砂や重曹で吸収する。
3. すべての廃棄物をビニール袋に入れ、汚染された布製品は洗濯するか廃棄する。
4. 影響を受けた表面を石鹼水で洗い、すすいで乾燥させる。再使用可能なツールは清掃し、消毒する。
5. 漂白剤溶液で表面を消毒する。水1ガロンに対して濃縮漂白剤 $\frac{1}{4}$ カップまたは普通の漂白剤1カップを使用する。
6. スプレーボトルで溶液を適用し、表面が少なくとも5分間湿った状態を保つようにする。
  - カーペットや布張りの家具の場合、スチームクリーニングを検討する。
  - 食品接触面は清水ですすぎ、手は石鹼でよく洗う。手指消毒剤はノロウイルスには効果がないため、石鹼で手を洗うことが重要です。



Japanese