

BODY FLUID CLEAN-UP PROCEDURES

B구토물이나 설사와 같은 체액에는 노로바이러스가 포함되어 있으며, 이는 최대 25피트까지 퍼져서 표면과 음식을 오염시킬 수 있습니다. 이는 소비자와 직원 모두에게 위험을 초래합니다. 구토물과 설사를 제대로 청소하기 위해서는 노로바이러스에 대한 노출을 효과적으로 줄이기 위해 일상적인 청소보다 더 엄격한 접근이 필요합니다.

효과적으로 청소하고 소독할 수 있는 대응 계획과 적절한 도구가 필수적이며, 이를 통해 직원과 고객을 보호할 수 있습니다.

첫 번째 단계:

1. 25피트(약 7.6미터) 이내의 모든 사람을 대피시키십시오.
2. 오염된 구역에 대한 접근을 차단하십시오.
3. 개인 보호 장비를 착용하십시오. 구토물이나 설사를 청소하는 사람은 최소한 일회용 장갑과 마스크를 착용해야 합니다.
4. 반경 내에 있는 덮개가 없는 음식과 일회용 품목을 폐기하십시오.
5. 해당 구역의 모든 식기류와 장비를 세척, 헹구고 소독하십시오.

- F보호복과 종이 타월을 사용하여 구토물이나 설사를 즉시 제거하고, 깨끗한 구역에서 오염된 구역으로 작업을 진행하십시오.
- 카펫에 있는 액체는 고양이 모래나 베이킹 소다로 흡수하십시오.
- 모든 폐기물을 비닐봉지에 넣어 처리하고, 오염된 천 제품은 세탁하거나 폐기하십시오.
- 영향을 받은 표면을 비눗물로 씻고, 헹구고, 건조하십시오. 재사용 가능한 도구는 청소하고 소독하십시오.
- 농축 표백제 $\frac{3}{4}$ 컵 또는 일반 표백제 1컵을 물 1갤런에 사용하여 염소 소독제를 만들어 표면을 소독하십시오.
- 스프레이 병으로 소독제를 뿌려 표면이 최소 5분 동안 젖은 상태를 유지하도록 하십시오.
 - 카펫과 실내 장식의 경우, 스팀 청소를 고려하십시오.
 - 식품 접촉 표면은 깨끗한 물로 헹구고, 손 세정제는 노로바이러스에 효과적이지 않으므로 비누로 손을 철저히 씻으십시오.



KOREAN