

BODY FLUID CLEAN-UP PROCEDURES

B体液如呕吐物和腹泻含有诺如病毒，可能传播到25英尺（约7.6米）远，污染表面和食物。这对消费者和员工都构成了风险。清理呕吐物和腹泻需要比常规清洁更严格的方法，以有效减少诺如病毒的暴露。

制定应对计划并使用适当的清洁和消毒用品对于保护您的员工和客户至关重要。

F首要步骤：

- 疏散所有在25英尺（约7.6米）范围内的人。
- 封锁进入污染区域的通道。
- 穿戴个人防护装备。任何清理呕吐物或腹泻的人至少应佩戴一次性手套和口罩。
- 丢弃区域内的未覆盖食物和一次性物品。
- 清洗、冲洗并消毒该区域内的所有餐具和设备。

清理步骤：

- 使用保护性衣物和纸巾立即清除呕吐物或腹泻，从清洁区域开始，逐步处理到污染区域。
- 用猫砂或小苏打吸收地毯上的液体。
- 将所有废物丢弃在塑料袋中，并清洗或丢弃被污染的布料物品。
- 用肥皂水清洗受影响的表面，冲洗并干燥。清洁并消毒任何可重复使用的工具。
- 用漂白剂溶液消毒表面，每加仑水中使用 $\frac{3}{4}$ 杯浓缩漂白剂或1杯普通漂白剂。
- 使用喷雾瓶喷洒溶液，确保表面保持湿润至少5分钟。
 - 对于地毯和软垫，考虑使用蒸汽清洁。
 - 用清水冲洗与食物接触的表面，并用肥皂彻底洗手，因为手部消毒剂对诺如病毒无效。



MANDARINE CHINESE