

# BODY FLUID CLEAN-UP PROCEDURES

Mga likido ng katawan tulad ng suka at pagtatae ay naglalaman ng norovirus na maaaring kumalat hanggang sa 25 talampakan, na nagdudulot ng kontaminasyon sa mga ibabaw at pagkain. Ito ay naglalagay ng panganib sa parehong mga mamimili at empleyado. Ang tamang paglilinis ng suka at pagtatae ay nangangailangan ng mas mahigpit na pamamaraan kaysa sa karaniwang paglilinis upang epektibong mabawasan ang pagkalantad sa norovirus.

Isang plano ng pagtugon at ang tamang mga kagamitan para sa epektibong paglilinis at disinfection ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong mga empleyado at mga customer.

## Mga Unang Hakbang:

- Lisanin ang lahat ng tao sa loob ng 25 talampakan.
- Harangan ang access sa kontaminadong lugar.
- Magsuot ng personal na protective equipment. Ang sinumang maglilinis ng suka o pagtatae ay dapat na magsuot ng mga disposable gloves at face mask.
- Itapon ang mga pagkain na hindi natakpan at mga disposable na item sa loob ng lugar.
- Hugasan, banlawan, at i-sanitize ang lahat ng kagamitan at kasangkapan sa lugar na iyon.

## Para sa Paglilinis:

- Agad na alisin ang suka o pagtatae gamit ang protective clothing at papel na tuwalya, mula sa malinis na lugar papunta sa kontaminadong lugar.
- Sipsipin ang mga likido sa carpets gamit ang kitty litter o baking soda.
- Itapon ang lahat ng basura sa plastic bags at labhan o itapon ang mga kontaminadong tela.
- Hugasan ang mga apektadong ibabaw gamit ang sabon na tubig, banlawan, at patuyuin. Linisin at disimpektahin ang anumang reusable na kagamitan.
- Disimpektahin ang mga ibabaw gamit ang solusyon ng bleach, gamit ang  $\frac{3}{4}$  tasa ng concentrated bleach o 1 tasa ng regular bleach sa bawat galon ng tubig.
- I-spray ang solusyon gamit ang spray bottle, tiyakin na ang mga ibabaw ay nananatiling basa ng hindi bababa sa 5 minuto.
  - Para sa carpets at upholstery, isaalang-alang ang paggamit ng steam cleaning.
  - Banlawan ang mga ibabaw na may contact sa pagkain gamit ang malinis na tubig at hugasan ng mabuti ang mga kamay gamit ang sabon, dahil ang hand sanitizers ay hindi epektibo laban sa norovirus.

